

طلب المساعدة

إذا أظهر الطفل أيّاً من العوارض التالية
خلال الأيام السبعة القادمة




حمى (38.4°C)




نزيف (دقائق >5)



فقدان الشهية



رائحة فم كريهة



قيح في موقع الجراحة



تقيؤ شديد



إسهال شديد



تغيرات في البول
(من حيث الكمية أو اللون)

الأيدي

خلال الأسبوعين القادمين:

لا تدع طفلك يلمس فمه أو أنفه لمدة أسبوعين



استخدم مثبتات الذراع (المساند
المقيّدة للحركة) لمعظم ساعات
النهار والليل

اسمح للطفل بتحريك ذراعيه ٣
مرات يومياً لمدة ١٠ دقائق ⚠️

في هذا الوقت راقب طفلك جيداً ولا تسمح
له بلمس الفم أو الأنف

GLOBAL SMILE FOUNDATION
مؤسسة الابتسامة العالمية

الرعاية بعد الجراحة الحنك المشقوق

اسم المريض:

الحساسيات:

رمز ال QR إلى صفحة لينك تري
الخاصة بمؤسسة GSF مع مقاطع
فيديو توضيحية




العناية الفموية

** لا تعبت بموقع الجراحة **

تنظيف الأسنان خلال ٢٤ ساعة:

قُم بتفريش:



في حال لم يُنصح أو لم يكن من الآمن تفريش الأسنان، يمكنك المسح برفق للأسنان السفلية، والأسطح الخارجية للأسنان العلوية، واللسان، وذلك باستخدام شاش مبلل بالماء أو بالكلورهكسيدين الخالي من الكحول (أو غسول الفم).



يُستأنف تفريش الأسنان بعد ٧-١٠ أيام مع حرص الحصول على موافقة الجراح:

تفريش الأسنان مرتين في اليوم (اي صباحًا ومساءً)

الحفاظ على نظافة الفم ليلاً وعدم إطعام الطفل بعد تفريش الأسنان مساءً




كمية معجون الأسنان بحجم حبة الأرز



التغذية

يوم العملية:

قم بإطعام طفلك أَلْفالايت (Alfalyte) أو بيداليايت (Pedialyte) باستخدام الحقنة. إذا كان الطفل يتحمل، ابدأ بالحليب الصناعي باستخدام الحقنة أو بالرضاعة الطبيعية من الثدي.



اليوم ١-١٠ بعد الجراحة:

الرضاعة الطبيعية: الإرضاع مباشرةً من الثدي

التغذية بالحليب الصناعي: يُستخدم حقنة ذات طرف مطاطي

التغذية الاعتيادية: طعام مهروس باستخدام الملعقة المقدّمة من مؤسسة GSF



اليوم ١١ حتى ٦ أسابيع بعد الجراحة:

الرضاعة الطبيعية: الإرضاع مباشرةً من الثدي

التغذية بالحليب الصناعي: يُستخدم حقنة ذات طرف مطاطي

التغذية الاعتيادية: أطعمة طرية باستخدام الملعقة المقدّمة من مؤسسة GSF مثل:



مهم:

- ممنوع تناول الأطعمة الصلبة أو القاسية لمدة ٦ أسابيع
- ممنوع تناول أطعمة ساخنة
- ممنوع استخدام اللهاية أو القشة لمدة ٦ أسابيع
- يجب أن يبقى الطفل مُرطبًا (يحصل على كفايته من السوائل) حتى لو كان يشعر بالألم
- اغسل فم الطفل بعد الأكل!
- يُمنع استخدام أي وسيلة أخرى غير الحقنة، أو الملعقة المائلة قليلاً ذات الطرف الطري المقدّمة من قبل GSF خلال ٦ أسابيع



علامات الجفاف:

