


BUSCAR AYUDA

Si el niño presenta alguno de los siguientes en los próximos 7 días:




Fiebre ($>38.4^{\circ}\text{C}$)



Sangrado (>5 mins)



No querer comer



Mal aliento




Pus en la herida de la operación



Vomita mucho



Mucha Diarrea



Cambios en la orina (Cantidad o color)

CUIDADO DE LA HERIDA

- No realizar actividad intensa o ejercicio por **4 semanas**



- No golpes directos en la cadera o la cara
- Puede bañarse con el vendaje durante **1 semana**



DESPUÉS DE 1 SEMANA:

- Puede remover el vendaje
- Aplicar bacitracina en la cadera por **1 semana**



BRACKETS DESPUÉS DE 3 MESES:

- Puede continuar el tratamiento de brackets, si está en curso o es necesario, **después de 3 meses**, y de haber sido autorizado por ortodoncista y cirujano.



FUNDACIÓN GLOBAL SMILE

CUIDADOS POSTERIORES A CIRUGÍA DE INJERTO ÓSEO ALVEOLAR

Nombre del Paciente: _____

Alergias: _____


Código QR del Linktree de GSF con videos de ejemplo en el cuidado apropiado.



CUIDADO ORAL

****No tocar el área de la cirugía****

CEPILLADO DENTAL DENTRO DE LAS 24HRS: CEPILLAR 2 VECES AL DIA (MAÑANA Y NOCHE):



Si el cepillado de dientes no es seguro o no se recomienda, limpie suavemente con una gasa empapada con agua embotellada o clorhexidina libre de alcohol (o enjuague bucal); la superficie externa de los dientes superiores, los dientes inferiores y la lengua, por 1 - 2 semanas.



CEPILLADO DE DIENTES 7-10 DÍAS LUEGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL CIRUJANO: CEPILLAR 2 VECES AL DIA (MAÑANA Y NOCHE):

Mantener la boca limpia en la noche, y no comer luego del cepillado de dientes nocturno.



ALIMENTACIÓN

DÍA DE LA CIRUGÍA:

- **2-3 horas después de la cirugía**, usa la jeringa o cuchara entregada por GSF para empezar a dar líquidos como...



Yogurt



Batido



- **Si lo tolera**, inicie comida blanda según lo prescrito por GSF

DÍA 1 - 10 POST-CIRUGÍA:

Comida triturada usando cuchara dada por GSF.



La comida debe deslizarse fácilmente de la cuchara



Helado cremoso suave



Sopa



Puré



Batidos



Yogurt



Gelatina




Flan simple

DÍA 11 - 12 SEMANAS POST-CIRUGÍA

- No ingerir alimentos duros como huesos, frutas/vegetales duros, queso, carne, etc. durante **3 meses**

- La comida debe ser suave para masticar fácilmente



Frutas Carne Queso Pan

IMPORTANTE:

- Mantener al niño hidratado, aún si tiene dolor.
- ¡Lavar la boca del niño luego de alimentarlo!
- **Solo** usar jeringa o cuchara ligeramente inclinada con punta suave proporcionada por GSF por 6 semanas.
- No comida caliente.
- No comida picante.



Signos de Deshidratación:

Menos pañales mojados



Orina Oscura



Piel y boca seca

