



BUSCAR AYUDA

Si el niño presenta alguno de los siguientes en los próximos 7 días:




Fiebre (>38.4° C)



Sangrado (>5 min)



No querer comer



Mal aliento



Pus en la herida de la operación



Vomita mucho



Mucha Diarrea



Cambios en la orina (cantidad o color)

FUNDACIÓN GLOBAL SMILE

CUIDADOS POST-QUIRÚRGICOS PARA FISURA LABIAL

Nombre del Paciente:

Alergias:

Código QR del Linktree de GSF con videos de ejemplo en el cuidado apropiado.



CUIDADO ORAL


****No tocar la herida de la operación****

SI NO TIENE DIENTES:


Limpiar la lengua con una gasa estéril empapada en clorhexidina o agua embotellada, 2 -3 veces al día.

SI TIENE DIENTES:

LUEGO DE 24 HORAS, CEPILLAR GENTILMENTE:



Limpiar suavemente con un hisopo o una esponja con clorhexidina la superficie externa de los dientes superiores.



REINICIAR EL CEPILLADO COMPLETO EN 7-10 DÍAS con autorización del cirujano

- Cepillar 2 veces al día.
- **No** alimentar luego de cepillar los dientes en la noche.

ALIMENTACIÓN

DÍA DE LA CIRUGÍA:

- Dar alfalyte o pedialyte usando una jeringa.
- Si tolera bien, empezar fórmula usando una jeringa o dar de lactar.



DURANTE 2 SEMANAS:



IMPORTANTE:

- Solo usar jeringa, cuchara ligeramente inclinada con punta suave o biberón especial proporcionado por GSF por **3 semanas**.
- Enjuagar con agua embotellada la boca del niño luego de cada comida.
- No comida sólida, dura o crujiente por 6 semanas.
- Mantener al niño hidratado, aún si tiene dolor.



CUIDADO DE LA HERIDA



LUEGO DE COMER:

Limpiar la herida (nariz y labios) con agua embotellada y gasa 2x2

IMPORTANTE:

- Evite usar antibióticos tópicos en el área limpia de Dermabond por **1 semana**, a menos que se formen costras.
- No chupones y el niño no puede succionar nada por **3 semanas**
- Evitar la exposición solar por 4 semanas
 - **Luego de 4 semanas**, aplicar bloqueador solar sobre el labio 30 minutos antes de salir.



6 SEMANAS:

En **6 semanas**, empezar masajes circulares en la cicatriz del labio 4 veces al día por 2 - 6 meses (usando gel cicatrizante si le fue dado)

CUANDO EMPIECE A FORMARSE LA COSTRA:

- Aplicar antibiótico tópico **3 - 4 veces al día** en la forma costrosa del labio y las fosas nasales.
- Usar la crema hasta que la costra se caiga.
- Si **NO HAY COSTRA**: empezar la crema **1 semana** luego de la cirugía.



MANOS

2 SEMANAS:

No dejar al niño tocarse la boca o nariz por **2 semanas**



Usar férulas inmovilizadoras la mayor parte del día y la noche



Permitir al niño mover los brazos **3 veces al día por 10 minutos**.

Vigile al niño cuidadosamente y no permita que se toque la boca o nariz durante este tiempo.