


BUSCAR AYUDA

Si el niño presenta alguno de los siguientes en los próximos 7 días:




Fiebre ($>38.4^{\circ}\text{C}$)



Sangrado (>5 mins)



No querer comer



Mal aliento




Pus en la herida de la operación



Vomita mucho



Mucha Diarrea



Cambios en la orina (Cantidad o color)

MANOS

2 SEMANAS:

No dejar al niño tocarse la boca o nariz por **2 semanas**



Usar férulas inmovilizadoras la mayor parte del día y la noche



Permitir al niño mover los brazos 3 veces al día por 10 minutos.

Vigile al niño cuidadosamente y no permita que se toque la boca o nariz durante este tiempo.

FUNDACIÓN GLOBAL SMILE

CUIDADOS POST-QUIRÚRGICOS PARA FISURA PALATINA

Nombre del Paciente: _____

Alergias: _____

Código QR del Linktree de GSF con videos de ejemplo en el cuidado apropiado.




CUIDADO ORAL


****No tocar la herida de la operación****

CEPILLADO DE DIENTES EN LAS PRIMERAS 24 HORAS:

CEPILLAR:



Si el cepillado de dientes no es seguro o no se recomienda, limpie suavemente con una gasa empapada con agua embotellada o clorhexidina libre de alcohol (o enjuague bucal); la superficie externa de los dientes superiores, los dientes inferiores y la lengua.



CEPILLADO DE DIENTES 7-10 DÍAS LUEGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL CIRUJANO:

CEPILLAR LOS DIENTES DOS VECES (MAÑANA Y NOCHE)

Mantener la boca limpia en la noche y no comer luego de lavarse los dientes.



Pasta de dientes del tamaño de un grano de arroz.



ALIMENTACIÓN

DÍA DE LA CIRUGÍA:

Dar alfalyte o pedialyte usando una jeringa. Si tolera bien, empezar con fórmula usando una jeringa o dar de lactar.



DÍA 1 - 10 POST-CIRUGÍA:

Lactancia materna: alimentar directamente del pecho.

Alimentación con fórmula: use una jeringa con punta de goma.

Alimentación regular: comida triturada usando cuchara dada por GSF.



DÍA 11 - 6 SEMANAS POST-CIRUGÍA:

Lactancia materna: alimentar directamente del pecho.

Alimentación con fórmula: use una jeringa con punta de goma.

Alimentación regular: comida blanda usando cuchara dada por GSF, como:



IMPORTANTE:

- No comidas sólidas o duras por 6 semanas.
- No comidas calientes.
- No chupones por 6 semanas.
- Mantener al niño hidratado, aún si tiene dolor.
- Lavar la boca del niño luego de alimentarlo.
- **Solo** usar jeringa, cuchara ligeramente inclinada con punta suave proporcionado por GSF por 6 semanas.



Signos de deshidratación:

Menos pañales mojados



Orina oscura



Piel y boca seca

